

התמודדות עם כאב לאחר ניתוח

			 <p>אקמול</p>	<p>רמת כאב</p> 
		 <p>אופטלגין</p>	 <p>Rokacet Plus</p>	
 <p>Etopan 500</p>		 <p>Celcox 20</p>	 <p>פרקוסט 5</p>	

- אקמול ופרוקסט ניתן לקחת עד 6 ביום (בסה"כ ביחד) ובנוסף עד 6 אופטלגין ביום.
- במקום Etopan ניתן לקחת גם Arcoxia או Advil במשך 10 ימים בלבד.
- Nexium 20 mg מפחית את הפרשת החומצה בקיבה ומגן עליה
- Laxadin 5mg - יש לקחת פעמיים בשבוע
- Clexan 2.5mg - מדללי דם
- אם הכאב פוחת לקחת חצי כדור פרקוסט במקום כדור שלם, אם הכאב חלש להחליף את הפרקוסט באקמול

שעה	8:00	10:00	13:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00
טיפול סביב השעון								
לפי הצורך					<p>או</p> 			
סותרים / חומצה / יציאות / מדללי דם					<p>סותרים</p> 	<p>פעמיים בשבוע לקסעדין</p> 		

